

**Zavod za zdravstveno varstvo  
Kranj**

Gospodsvetska ulica 12  
p.p. 128  
4001 KRANJ

Telefon: 04 2017 100

Faks: 04 2017 113



**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
K R A N J**

Gospodsvetska ulica 12, 4000 Kranj

*Zaščitite svoje zdravje in  
izboljšajte kakovost življenja*



## MIKROSPORIJA



Kranj, december 2009

Več o Zavodu na domači strani:  
<http://www.zzv-kr.si/>

## Kaj je mikrosporija?

Mikrosporija je **glivično obolenje kože**, ki ga najpogosteje povzroča gliva *Microsporum canis*. Že več let je razširjena v številnih območjih Slovenije. Na Gorenjskem spada med deset najpogosteje prijavljenih nalezljivih bolezni. Največkrat zbolijo otroci.

## Kdo jo prenaša?

Mikrosporija je zelo nalezljiva bolezen, ki se prenaša **z neposrednim dotikom** z obolelo živaljo, najpogosteje **z mačkami**, lahko tudi s psi, zajci in hrčki. Prenaša se tudi **posredno** z dlakami, luskami in predmeti iz okolja, kjer se zadržuje okužena žival, ali pa **med ljudmi** s tesnim stikom z obolelim.

**Z mikrosporijo se lahko okužimo tudi ob stiku z živaljo, ki ne kaže bolezenskih znakov.**

## Bolezni znaki

Bolezni znaki se pri človeku pojavijo v sedmih do desetih dneh po okužbi, redko kasneje, v času do treh tednov. Bolezenska žarišča so običajno na koži odkritih delov telesa: predvsem na obrazu, vratu, rokah, nogah in tudi po lasišču. To so pordela mesta, največkrat velikosti kovanca, z drobnim luščenjem ob robu, ostro omejena od zdrave kože, lahko rahlo srbijo. Spremembe v lasišču so pogostejše pri majhnih otrocih. Lasje so odlomljeni tik nad kožo, ki je prekrita z drobnimi

luskami. Redko se razvije globoka oblika z močnim vnetjem in oteklino, iz katere se izceja gnoj.

## Kako ukrepamo?

Žarišča, sumljivega za mikrosporijo, ne mažemo, temveč prekrijemo s suho gazo. V nekaj dneh obiščemo zdravnika. Bolezen se lahko razširi na druge dele telesa ali na ljudi, ki so v tesnem stiku, zato ukrepamo čimprej.

## Postavitev diagnoze

Klinični pregled pogosto ne zadostuje za dokončno diagnozo. V nekaterih ambulantah imajo na voljo Woodovo svetilko, s katero lahko pregledajo predele lasišča - v temi bolezenska žarišča zasvetijo zelenkasto. Zanesljivost pregleda je le 50- odstotna.

Za potrditev diagnoze je običajno potrebna laboratorijska preiskava. Vzorce za preiskavo odvzame zdravstveno osebje v ambulanti, preiskavo pa opravljamo v laboratoriju za medicinsko mikrobiologijo Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj z napotnico zdravnika ali samoplačniško.

## Zdravljenje

Mikrosporijo zdravimo z zdravili, ki zavirajo rast gliv (antimikotiki). Predpiše nam ji zdravnik. Običajno je to mazilo, s katerim mažemo obolela mesta 2 – 3 krat na dan. V primeru, da je žarišč veliko in da so spremembe v lasišču, je potrebno poleg mazila še zdravljenje s tabletami.

Med zdravljenjem obolele predele pokrijemo z gazo ali obližem. Zdravljenje je uspešno, lahko pa traja več mesecev. O obiskovanju šole in vrtea odloči zdravnik.

## Preprečevanje okužbe

V primeru, da je bila pri nekom v družini ugotovljena mikrosporija, je potrebno domače mačke ali pse peljati k veterinarju. Zdravljenje živali je razmeroma enostavno. Otrokom odsvetujemo igro s tujimi in potepuški mačkami in psi.

## Odvzem kužnine

V ambulanti obolelo mesto najprej očistijo. Na predmetno stekelce s sterilnim skalpelom postrgajo kožo po robu med bolnim in zdravim predelom. Običajno odvzamejo dva vzorca: enega za izdelavo nativnega preparata in drugega za kultivacijo. Ostružke pokrijejo z drugim predmetnim stekelcem, zalepijo z lepilnim trakom, opremijo z bolnikovimi podatki in z napotnico pošljejo v laboratorij. Izvid pregleda nativnega preparata je v enem dnevu, za kultivacijo pa je potrebno 4-6 tednov.

Odvzem kužnine opravljamo tudi v ambulanti Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj. Naročite se lahko po telefonu **(04 /20 17 100) ali v recepciji Zavoda.**